

EC FERTILIZER
Bor (B) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
BORINC FAST

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(W / W)
Suda Çözünür Bor (B)	%10
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%11

ÖZELLİKLER

BORINC FAST uygulamalarının çiçek öncesi, olgunlaşma öncesi ve hasattan hemen sonra yapılmasını tavsiye ederiz.

DOZ VE KULLANMA TALİMATLARI
Yapraktan Uygulamalar

Bitki Türü	Uygulama Süreci	Doz
Meyve ağaçları (sert çekirdekli, yumuşak çekirdekli, narenciye, zeytin, şaraplık üzüm vb.)	Olgunlaşma öncesi, hasat öncesi ve hasat sonrası uygulama	100-150 g/da
Yapraklı ve çiçekli sebzeler (marul, lahana, hindiba vb.)	4.-6.yaprak aşamasından başlayarak her 12-15 günde 1-2 uygulama	80-100 g/da
Sebzeler (domates, biber, kabak vb.)	Çiçek öncesi ve olgunlaşma öncesi	100-150 g/da
Tahıllar ve endüstriyel ürünler	4.-6.yaprak aşamasından başlayarak her 12-15 günde 2-3 uygulama	80-100 g/da
Fidanlıklar ve süs bitkileri	Vejetatif başlangıçta her 12-15 günde 1-2 uygulama	50-80 g/da

*Min. Su hacmi: Genel meyve ağaçları için 100-120 L/Da, Sebzeler ve otsu bitkiler için 50- 60L/da olmalıdır.

UYARILAR

Yaprak uygulamaları günün en serin saatlerinde yapılmalıdır.
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek durumlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

BORINCFAST

Borik asit ve çinko sülfat içerir.



TEHLİKELİ

- *DİKKAT ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.
 - *GÖZ, YÜZ VE DERİ İLE TEMAS ETTİRMEYİNİZ.
 - *MUTLAKA KORUYUCU GÖZLÜK VE ELDİVEN KULLANINIZ.
 - *SU HAYATI İÇİN UZUN SÜRELİ TOKSİK ETKİLER YAPABİLİR.
 - *KULLANIRKEN YEMEK YEMEYİNİZ, İÇECEK VE SİGARA İÇMEYİNİZ.
 - *KULLANIMDAN SONRA ELLERİNİZİ BOL SU İLE YIKAYINIZ.
 - *KULLANDIKTAN SONRA AMBALAJLARI İMHA EDİNİZ.
- GÖZLERE TEMAS HALİNDE BOL SU İLE YIKAYINIZ. LENS KULLANILIYORSA MUTLAKA ÇIKARTILIP TEKRAR GÖZLERİN YIKANMASI GEREKLİDİR. MUTLAKA DOKTOR YA DA TIBBİ YARDIM ALINIZ. İYİ HİSSETMEZSENİZ MUTLAKA DOKTORA BAŞVURUNUZ. ELBİSE VE EKİPMANLARI TEKRAR KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA YIKAYINIZ.

Net Ağırlık :

Üretici : CİFO S.r.l

KARIŞABİLİRLİK

BORINC FAST, normal dozajlarda bütün CIFO ürünleri ile karıştırılabilir. Her zaman ön karışabilirlik testleri yapılmasını tavsiye ederiz.

DEPOLAMA

Sadece ihtiyaç durumunda kullanınız. Tavsiye edilen dozajları aşmayınız.
Gözlere ve deriye temastan uzak tutunuz.
Ürün normal depolama sıcaklıklarında ve nemde değişikliğe uğramaz.
Bu ürün yanıcı veya toksik değildir.
Ürünü 4°C ve 40°C depolama aralığında tutunuz.

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren beş yıldır.

LİSANS NO:

TESCİL NO:

ÜRETİM TARİHİ:

PARTİ NO:

NET AĞIRLIK:

İtalya'dan ithal edilmiştir.

ÜRETİCİ FİRMA:

CIFO S.R.L

Via Oradour 6/8

San Giorgio di Piano (BO) ITALY

Production plant of San Giorgio di Piano (BO)

İTHALATÇI FİRMA:

CİFAGRO TARIM İLAÇ VE GÜBRE ÜRÜNLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

Çınarlı Mah.61027 Sokak Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi

A Blok No:18 İç Kapı No:81 Seyhan/Adana TURKEY

Tel: +90 322 456 25 56 Fax: +90 322 456 25 66

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ve taahhüt ederiz.

CİFAGRO

Tarım İlaç ve Gübre Ürünleri Satış ve Pazarlama Ltd.Şti.
Çınarlı Mah. 61027 Sok. Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi
A Blok No:18 İç Kapı No:81 Seyhan/ADANA Tel:0322 456 25 56
Merkezi No:0209049035500018 Tic.Sic.No:54093
Yüreğir V.D.: 209 049 0355


Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili