

EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
FLORAL N 30 – 12 – 8 + ME
GARANTİ EDİLEN İÇERİK (W/W)
 Toplam Azot (N) %30
 - Amonyak Azotu (N) %2
 - Nitrat Azotu (N) %2
 - Üre Azotu (N) %26
 Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P₂O₅) %12
 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) %8
 Suda Çözünür Bor (B) %0,1
 Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile şelatlanmış) %0,05
 Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile şelatlanmış) %0,1
 Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile şelatlanmış) %0,1

ŞELAT AJANI: EDTA
 Şelatın stabil pH aralıkları 2-10.

ÖZELLİKLER
 Floral N 30-12-8+ME, yapraklar tarafından kolaylıkla alınabilecek bir formülasyon olup, özellikle bütün süs bitkileri ve tarımsal ürünlerin ilk gelişim dönemleri için uygundur. Bitki besleme elementlerinin yüksek saflığı ve kalitesi, ürünün tam çözünürlüğünü ve düşük tuzlu çözelti oluşmasını sağlar. Bunun ötesinde, formülasyon, yapraklardan elementlerin ihtiyaç duyuldukları yerlere hızlı bir şekilde taşınmasına olanak verir.

UYGULAMA DOZAJLARI ve KULLANIMI
Yapraklı uygulamalar
 - **Sofralık ve şaraplık üzüm:** 200-250 g/100 L su. Tomurcukların 10cm'ye ulaşmasından üzümler peppercorn büyüklüğüne ulaşana kadar devam edilir.

- **Şeftali, erik, kayısı, kiraz, fındık ağaçları:** 250-300 g/100 L su. Tomurcukların açılmasından hemen sonra uygulamaya başlanır, çekirdek evi oluşana kadar devam edilir. Son aşamalarda ürün funfisit ve isnektisitlerle karıştırılır.

- **Elma ve armut ağaçları:** 250-300 g/100 L su. Gelişimin ilk dönemlerinde uygulanır. Ayrıca karaleke ilaçları ve insektisitlerle (çiçeklenmeden, meyve oluşumundan ve irileşmeden önce) karıştırılabilir.

- **Narenciye:** 300-400 g/100 L su. Floral N 30-12-8+ME, özellikle azota çok ihtiyaç duyan herdem yeşil ağaçların bütün gelişim devreleri boyunca uygulanabilir, uygulamalar için en uygun dönemler her türlü durumda yeni yaprakların oluşmasından meyve teşekkülüne kadar olan periyottardır.

- **Kivi:** 250-300 g/100 L su. Yeni tomurcukların oluşumundan meyve tutumunun sonuna kadar uygulayın.

- **Zeytin:** 250-300 g/100 L su. Gelişim başlangıcından meyve teşekkülüne kadar uygulayın.

- **Çilek:** 200-250 g/100 L su. Dikimden sonra 2 – 3 kez uygulayın. Daha sonra çiçeklenme başlangıcına kadar uygulayın.

- **Sebzeler:** 250-300 g/100 L su. Yaprakları yenen sebzeler (marul, roka vs) için ürünü en erken safhalarda en düşük dozda uygularken, meyvesi yenen sebzelerde dikimden meyve tutumuna kadar uygulanır.

- **Endüstri Bitkileri:** Kullanılan su normal miktarda tutularak 4 -5 kg/hektar uygulanır. Ayrıca herbisit ve pestisitlerle karıştırılarak ilk gelişim dönemlerinde uygulanır

- **Hübubat:** 4-5 kg/hektar ürün yeteri miktarda su ile uygulanır. Filizlenmenin sonunda veya sap uzamasının başlangıcında sadece 1 defa uygulanır. Ürün herbisitlerle de karıştırılabilir.

- **Yem bitkileri:** 4-5 g/hektar için 600-700 litre su. Ürünün biçilme işleminden sonra kullanılması yeni filizlerin oluşumunu teşvik eder.

- **Kesme Çiçekler, Fidanlık bitkileri ve yeşil alan:** 250-300 g/100 L su. Gelişimin ilk dönemlerinde ve çiçek tomurcuklarının oluşmadan önce uygulanır. Orkideler için ürün, sadece yetişkin bitkilerde kullanılır.

- **Tropik bitkiler:** 200-250 g/100 L su. Çiçeklenme başlangıcında ve meyve teşekkülü sonrasında kullanılır.

UYUMLULUK
 Floral N 30-12-8+ME; beyaz yağlar, yağ bazlı insektisitler Phosetyl-Al, Dodine, Triphorine ve güçlü alkali reaksiyonlu bütün preparatlar hariç olmak üzere genel olarak CIFO ürünlerini tüm pestisitlerle tavsiye edilen oranlarda karıştırılabilir. Karışılabilirlik testlerinin yaptırılması tavsiye olunur.

UYARILAR
 Kapalı alanlarda (seralar, tüneller vs) doz 200g/100 L su (%0.2)'yi geçmemelidir. Yaprak uygulamaları günün en serin saatleri sırasında yapılmalıdır.

*ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ. AĞIZ YOLUYLA VÜCUDA ALMAYINIZ. KULLANDIKTAN SONRA ELLERİNİZİ SU İLE YIKAYINIZ. TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DİŞİNDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR. GÖZLERE TEMAS HALİNDE DERHAL BOL SU İLE YIKAYINIZ VE TIBBİ YARDIM ALINIZ. KULLANIM SONRASI BOŞ KUTUYU ETRAFTA BIRAKMAYINIZ.

TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK GÜBRE KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.
FİRMA BEYANI
 İthalatçı firma, ürünün kalitesini garanti eder, ancak ürünün kendisinin yanlış şekilde veya üretici tarafından önerilen uygulamalarından farklı şekillerde kullanılmasından kaynaklanan zarar ve ziyanlarda ve üründen istenilen randımanın alınmamasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

DEPOLAMA
 ÜRÜNÜ GERÇEK İHTİYAÇ HALİNDE KULLANINIZ. TAVSİYE EDİLEN DOZAJI AŞMAYINIZ. ÜRÜN, NORMAL SAKLAMA SİCAKLIKLARINDA SAKLANMALIDIR. DEĞİŞİKLİKLERE UĞRAMAZ. DİKKATLİCE MUHAFAZA EDİLEREK TEHLİKELİ DEPOLAMADAN KAÇINILMALIDIR. DEPOLAMA SİCAKLIĞI: +4 / +40 °C (DERECE) OLMALIDIR.

Üretim Tarihi : **Ambalajın üzerindedir.**
 Parti No : **Ambalajın üzerindedir.**
 Son Kullanma Tarihi: **Üretim tarihinden itibaren beş yıldır.**
 Tescil No : **13017**
 Lisans No : **1066**
İtalya'dan ithal Edilmiştir.

Net Ağırlık:
ÜRETİCİ FİRMA:
CIFO S.r.l Via Oradour, 6/8, 40016 S. Giorgio di Piano, (BO) ITALYA
 www.cifo.it info@cifo.it

İTHALATÇI FİRMA
CİFAGRO TARIM İLAÇ VE GÜBRE ÜRÜNLERİ
SATİŞ VE PAZARLAMA LTD ŞTİ.
 Cınarlı Mahallesi 61027 Sk. Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi A Blok No: 18 Kat: 8 İç Kapı No: 81
 Seyhan – Adana / Türkiye
 Tel : +90 322 456 25 56 (pbx)
 Fax : +90 322 456 25 66
 Web : www.cifagro.com.tr

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.



EC FERTILIZER

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

FLORAL N 30 - 12 - 8 + ME

- **Agrumi:** İmpiegare 300-400 g per ettolitro d'acqua. La distribuzione di FLORAL N può avvenire durante tutto il ciclo delle colture sempreverdi, particolarmente avide di azoto; Le fasi che si avvantaggiano particolarmente sono, in ogni caso, quelle che vanno dall'inizio della nuova vegetazione alla formazione dei frutti.

- **Actinidia:** Impiegare 250-300 g per ettolitro d'acqua. Si consigliano trattamenti quindicinali, iniziando dalla formazione dei nuovi germogli e fino ad allegagione avvenuta. Gli interventi periodici favoriscono uno sviluppo armonico delle piante e un'abbondante fioritura.

- **Olivo:** Impiegare 250-300 g per ettolitro d'acqua. Intervenire nelle prime fasi vegetative (fino alla post-allegagione).

- **Fragola:** Impiegare 200-250 g per ettolitro d'acqua. Eseguire 2-3 interventi nel periodo post-trapianto, ripetendoli nella fase che va dalla ripresa vegetativa alla fioritura. Il particolare rapporto NPK garantisce un ottimale sviluppo di foglie e di fiori.

- **Ortaggi:** Impiegare 250-300 g per ettolitro d'acqua. Sulle colture il cui prodotto finale è il frutto (pomodoro, peperone, melanzana, ecc.) sarà consigliabile intervenire con FLORAL N dopo il trapianto ad allegagione avvenuta. Su quelle da foglia (lattuga, radicchio, ecc.) distribuire il prodotto nelle primissime fasi vegetative, alla dose più bassa.

- **Colture industriali (tabacco, bietola, ecc.):** Distribuire 4-5 kg di prodotto per ettaro, usando il quantitativo d'acqua comunemente impiegato. E consigliabile intervenire nelle prime fasi vegetative, anche in abbinamento a trattamenti diserbanti o antiparassitari. L'uso di FLORAL N si rende particolarmente necessario per le colture seminate o trapiantate nei terreni meno fertili e siccitosi.

- **Cereali:** Impiegare 4-5 kg di prodotto per ettaro, usando il quantitativo d'acqua comunemente impiegato. Si consiglia un unico trattamento a fine accestimento – inizio levata, anche in abbinamento al diserbo primaverile.

- **Foraggere:** Impiegare 4-5 kg di prodotto per ettaro disciolti in 600-700 l d'acqua. L'uso del prodotto, pochi giorni dopo lo sfalcio, rende più veloce la formazione di nuovi ricacci.

- **Piante ornamentali, da fiore, vivai e tappeti erbosi:** Impiegare 250-300 g per ettolitro d'acqua. Si consiglia di intervenire nelle prime fasi vegetative e comunque prima della formazione dei boccioli fiorali. Per le orchidee è consigliabile applicare il FLORAL N solo in piante adulte.

- **Piante tropicali:** Impiegare 200-250 g per ettolitro d'acqua. Eseguire i trattamenti in pre-fioritura e post-allegagione.

L'impiego di FLORAL N è possibile anche in fertirrigazione, nel qual caso i dosaggi per ettaro dovranno essere molto più elevati e dovranno essere correlati alle esigenze nutritive delle singole colture. Quanto all'epoca d'impiego valgono le stesse considerazioni fatte per le applicazioni fogliari.

Compatibilità
 FLORAL N è miscibile alla dose d'impiego con i prodotti CIFO e con gli antiparassitari in genere, ad eccezione degli oli bianchi, degli insetticidi a base oleosa phosethyl-Al, dodina, triforina e di tutti i formulati con reazione fortemente alcalina. In ogni caso si consigliano prove di miscibilità preliminari.

Avvertenze
 In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.) la dose non deve superare i 200 g per hl d'acqua (0,2%).

Le applicazioni fogliari vanno effettuate di norma nelle ore più fresche della giornata. La CIFO mentre garantisce la qualità del prodotto, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali derivanti da applicazioni non corrette del prodotto stesso o comunque difformi dalle indicazioni suggerite.

Immagazzinare con cura e attenzione, evitando stoccaggi precari. Il prodotto non subisce alterazioni immagazzinato alle normali temperature di stoccaggio. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Floral N
CONCIME CE
 Concime NPK 30-12-8 con boro (B), rame (Cu), manganese (Mn) e zinco (Zn) a basso tenore di cloro ottenuto per miscelazione.

Azoto (N) totale 30% - Azoto (N) nitrico 2% - Azoto (N) ammoniacale 2% - Azoto (N) ureico 26% - Anidride fosforica (P₂O₅) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua 12% - Anidride fosforica (P₂O₅) solubile in acqua 8% - Boro (B) solubile in acqua 0,1% - Rame (Cu) solubile in acqua 0,05% - Rame (Cu) chelato con EDTA 0,05% - Manganese (Mn) solubile in acqua 0,1% - Manganese (Mn) chelato con EDTA 0,1% - Zinco (Zn) solubile in acqua 0,1% - Zinco (Zn) chelato con EDTA 0,1%

Agente chelante: EDTA
 Intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata: 2-10

Caratteristiche
 FLORAL N è un formulato ad assorbimento fogliare particolarmente indicato per le prime fasi vegetative di tutte le colture agrarie e ornamentali. Il particolare rapporto NPK, ad elevato tenore azotato, e la presenza di microelementi chelati assicurano alle piante un ottimo sviluppo vegetativo e una completa prevenzione dalle più comuni fisiopatie da squilibri o carenze micronutrizionali. L'elevata purezza e qualità degli elementi nutritivi contenuti consente di ottenere una completa solubilizzazione del prodotto e la formazione di una soluzione a bassa salinità. Inoltre, il formulato è addizionato di sostanze adesivanti e veicolanti che ne migliorano l'assorbimento fogliare e consentono una veloce traslocazione degli elementi nutritivi nei siti di utilizzo. FLORAL N può essere favorevolmente impiegato su tutte le colture ed è particolarmente indicato nelle prime fasi vegetative, durante le quali le piante formano le nuove radici, si preparano alla fioritura e alla fecondazione, allegano i frutti e producono la massima quantità di sostanza secca; E in queste fasi che si registra generalmente il massimo fabbisogno di azoto. La distribuzione di FLORAL N risulta particolarmente utile alle piante giovani, a quelle deboli e stentate e a quelle particolarmente avide di azoto, soprattutto se coltivate in terreni poveri di sostanza organica o molto sciolti.

Dosi e modalità d'impiego
Applicazioni fogliari
 - **Vite e uva da tavola:** Impiegare 200-250 g per ettolitro d'acqua. Le applicazioni iniziano quando i germogli raggiungono la lunghezza di circa 10 cm e proseguono fino alla fase di "acino grano di pepe". Il boro presente nel formulato favorisce i processi di fecondazione dei fiori, evitando l'insorgenza dell'acinellatura verde.

- **Pesco, susino, albicocco, ciliegio, mandorlo:** Impiegare 250-300 g per ettolitro d'acqua. Si consiglia di intervenire subito dopo la scamicatura e fino alla fase di "frutto noce", abbinando eventualmente il prodotto ai trattamenti fungicidi e insetticidi primaverili. Nelle specie a ciclo breve sarà necessario effettuare almeno 2-3 interventi, abbinando il prodotto ai principali trattamenti fungicidi primaverili.

- **Melo, pero:** Impiegare 250-300 g per ettolitro d'acqua. Sono consigliabili interventi precoci (prefioritura, allegagione, inizio ingrossamento frutto), anche in abbinamento ai trattamenti antisciolatura e insetticidi. Il boro presente nel formulato evita la formazione di frutti suberosi e deformati dovuti alla carenza di questo elemento.



Peso netto
Fabbicante:
 CIFO S.r.l. - Via Oradour 6/8
 San Giorgio di Piano (BO)
 Stab. di San Giorgio di Piano (BO)

