

ME, beyaz yağlar, yağ bazlı böcek öldürücü ilaçlar ve yüksek alkalın reaksiyonu ile tüm preparatlar istisna olmak üzere, CIFO ürünleri ve zirai ilaçlarla önerilen dozda karıştırılabilir.

Uyarılar

Korunan alanlarda (seralar, tüneller vs.) doz (%0,2) suyun 200 g/100 L oranını geçmemelidir.

Yaprak uygulamaları günün en serin saatlerinde yapılmalıdır.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız. Tahriş edicidir, göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz.

Göz ve elle temasta bol su ile yıkayınız. Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız ve boş ambalajları imha ediniz.

Firma Beyanı

ithalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder.

Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır.

Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek toksisite, kalıntılar, etkili olmayış gibi sonuçlar kullanıcının sorumluluğundadır.

ÜRÜN NORMAL DEPOLAMA SICAKLIKLARINDA MUHAFAZA EDİLDİĞİNDE BİR DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMAZ. ÜRÜNÜ DİREKT GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ BIRAKMAYINIZ. GÖZ VE DERİYE TEMASTAN UZAK TUTUNUZ.

DEPOLAMA SICAKLIĞI: 0 - +40 °C

Üretim Tarihi : Ambalajın üzerindedir.

Parti No : Ambalajın üzerindedir.

SON KULLANMA TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren beş yıldır.

TESCİL NO: 13719

LİSANS NO: 1066

İtalya'dan İthal Edilmiştir.

NET AĞIRLIK:

ÜRETİCİ FIRMA:

CIFO S.r.l.

Via Oradour 6/8 - 40016 San Giorgio

di Piano (BO) ITALY

Production plant of San Giorgio di

Piano (BO)

İTHALATÇI FİRMA

CİFAGRO TARIM İLAÇ VE GÜBRE

ÜRÜNLERİ

SATIŞ VE PAZARLAMA LTD ŞTİ.

Çınarlı Mah. 61027 Sokak Sunar

Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi

A Blok No:18 İç Kapı No:81

Seyhan / Adana - TURKEY


Tel: +90 322 456 25 56

Fax: +90 322 456 25 66

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.



EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ FLORAL P 11-30-11 (22 SO₃) + ME



EC FERTİLİZER

**NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
FLORAL P 11-30-11 (22 SO₃) + ME**

Garanti Edilen İçerik:	w/w
Toplam Azot (N)	%11
Amonyak Azotu (N)	%11
Suda çözünür Fosfor	
Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%30
Suda Çözünür Potasyum	
Oksit (K ₂ O)	%11
Suda çözünür Kükürt	
Trioksit (SO ₃)	%22
Suda çözünür Bor (B)	%0,1
Suda Çözünür Bakır (Cu)	Tamamı
EDTA ile şelatlıdır	%0,05
Suda ÇözünürMangan (Mn)	Tamamı
EDTA ile şelatlıdır	%0,1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	Tamamı
EDTA ile şelatlıdır	%0,1
Mn, Zn ve Cu EDTA, 2-10 pH aralığında stabildir.	

Özellikleri:

FLORAL P 11-30-11 (22 SO₃) + ME özellikle vejetatif dönemin ilk aşamalarında ön çiçeklenmeden ilk meyvye, tüm kesme çiçek, fidanlık ve tarım ürünlerinin yapraklardan alınması için üretilmiş bir gübredir. Ürün içerisindeki besin maddelerinin saflığı ürünün tamamen çözünmesini sağlar.

Tamamen çözünen ürün gerekli besinlerin hızlı bir şekilde ulaşımını sağlar.

İlk vejetatif aşamalarında, ekim sonrası ve çiçeklenmeden önce, bitkilerin yüksek miktarda fosfor ihtiyacı durumunda kullanılması tavsiye edilir.

Dozajlar ve Kullanma Talimatları: YAPRAK UYGULAMALARI

Üzüm bağları ve fidancılıkta, her 10.000 m² 1000 L su kullanın, endüstriyel ve otsul bitkilerde her 10.000 m² için minimum 500 L su kullanın.

Şaraplık sofra üzümü: 200-250 g/100 L su. Çiçeklenmeden önce meyve oluşumuna kadar uygulayın.

Şeftali, erik, kayısı, badem ve kiraz: 250-300 g/100 L su. Başlangıç döneminden meyve oluşumuna kadar uygulayın.

Elma ve armut: 200-250 g/100 L su. Çiçeklenmeden önce, çiçeklenmeden sonra ve meyve oluşumuna kadar uygulayın.

Narenciye: 300-400 g/100 L su. Vejetatif gelişmeden meyve oluşumuna kadar uygulayın.

Zeytin: 250-300 g/100 L su. İlk vejetatif gelişme aşamasından sertleşmeye kadar uygulayın.

Çilek: 250-300 g/100 L su. Çiçeklenme öncesi ve sonrasında uygulayın.

Sebzeler: 200-300 g/100 L su. İlk gelişme aşamasından tamamen gelişme süresince uygulayın.

Endüstriyel ürünler (tütün, şeker pancarı, vs): ilk gelişme dönemi boyunca 10.000 m² için 4-5 kg.

Tahıllar: ilk gelişme dönemi boyunca 10.000 m² için 4-5 kg.

Kesme Çiçekler ve yeşil alan: 250-300 g/100 L su. İlk gelişme aşamasından çiçeklenme öncesine kadar uygulayın.

Uyumluluk

FLORAL P 11-30-11 (22 SO₃) +

