

YALNIZCA GERÇEK İHTİYAÇLAR DURUMUNDA KULLANINIZ. TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR. ÜRÜNÜ KULLANDIKTAN SONRA BOŞ KUTUYE ÇEVREDE BIRAKMAYINIZ.

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren beş yıldır.

Tescil No: 13631

Lisans no: 1066

Üretim Tarihi : Ambalajın üzerindedir.

Parti No : Ambalajın üzerindedir.

İtalya'dan ithal Edilmistir



EC FERTILIZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

Idrofloral 14-25-5

NET AĞIRLIK:

ÜRETİCİ FİRMA:
CIFO S.r.l
San Giorgio di Piano
Bologna İTALYA
www.cifo.it info@cifo.it

İTHALATÇI FİRMA
**CİFAGRO TARIM İLAÇ VE
GÜBRE ÜRÜNLERİ SATIŞ
VE PAZARLAMA LTDÇ ŞTİ.**
Çınarlı Mah. 61027 Sokak
Sunar Nuri Çomu İş ve
Alışveriş Merkezi
A Blok No:18 İç Kapı No:81
Seyhan / Adana / TÜRKİYE
Tel: +90 322 456 25 56
Fax: +90 322 456 25 66

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz



EC FERTILIZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ IDROFLORAL 14-25-5

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ	% W/W
Toplam Azot (N)	% 14
Amonyak Azotu (N)	% 14
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	% 25
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 5

Ozellikler: IDROFLORAL 14-25-5, yüksek oranda suda çözünen bir toz gübredir, özellikle damlama sulama (fertigasyon) ile gübrelenen açık alanlarda ya da seralarda uygulamalar için hazırlanmıştır, fakat aynı zamanda yaprak uygulamaları için de uygundur. Makro elementler arasındaki oran, genel anlamda ürünlerin vejetatif döngülerinin ilk ve orta aşamaları için ve fosfor gerektiren bitkiler için uygundur.

Dozlar ve kullanım talimatları

Gübrelem (İlk ve son uygulamaların yanlız su ile yapılması tavsiye edilir).

Ürün	Uygulama dönemi	Doz kg/da
Armut, elma, şeftali, kayısı, erik, vişne, fındık ağacı, zeytin, Bağ	Vejetatif büyümeden meyvelerin irileşmesine kadar	12-15*
Genel narenciye ve ağaç bitkileri	Vejetatif büyümeden meyvelerin irileşmesine kadar	13-16*
Kivi	Vejetatif büyümeden meyvelerin irileşmesine kadar	12-16*
Sebzeler	Vejetasyon döngüsünün ilk ve orta evreleri esnasında	12-14
Fidanlıklar	Gelişimin ilk evrelerinde	12-14
Kesme Çiçekçilik	Vejetasyon başlangıcından çiçeklenmeye kadar	12-14
Yeşil alan	Ekim sonrasında ve her biçmeden sonra	10-12

(*) Toplam doz, birkaç defa da uygulanmalıdır. Püskürtme cubuğu ya da lister ile yapılan gübreleme uygulamalarında, su:gübre için minimum oran = 1:10 olacaktır.

Yaprak uygulamaları:

Meyve Ağaçları ve Bağlar: ilk gelişim evresinden orta gelişim evresine kadar. 300-400 g/da.

Sebzeler: Ekim döngüsünün orta evresinden itibaren: 300-400 g/da

Endüstriyel ürünler: Ekim döngüsünün orta evresinden itibaren: 800-1000 g/da

Kesme Çiçekçilik: Tomurcuk oluşumu esnasında: 300 g/100L

Uyarılar: Kapalı alanlarda (seralar, tüneller, vs.) yaprak dozajı, 100 litre su başına 200 g'l suyu geçmemelidir (%0,2). Yaprak uygulamaları, günün en serin saatlerinde yapılmalıdır.

DEPOLAMA SICAKLIĞI 0-45 °C 'DIR.

TOPRAK VE/VEYA YAPRAK ANALİZİ YAPTIRILARAK KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR.

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.

Tahriş edicidir. Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. Göz ve elle temasta bol su ile yıkayınız. Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız ve boş ambalajları imha ediniz.

İthalatçı firma, ürünün kalitesini garanti etmektedir, ürünün kalitesini garanti etmektedir ancak ürünün kendisinden ya da üretici tarafından tavsiye edilenden farklı şekilde yapılacak yanlış bir uygulamadan doğan kısmi olarak başarılı sonuçlar ya da nihai hasarlar için sorumluluk almamaktadır. ÜRÜN NORMAL SAKLAMA SICAKLIKLARINDA SAKLANDIĞINDA DEĞİŞİME MARUZ KALMAMAKTADIR. TEHLİKELİ DEPOLARDAN UZAK OLARAK DİKKATLE SAKLAYINIZ, ÜRÜNÜ