

EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
IDROFLORAL 15-10-30 + (5 SO₃)

Garanti Edilen İçerik	(W / W)
Toplam Azot (N)	% 15
Amonyak Azotu (N)	% 4
Nitrat Azotu (N)	% 8,5
Üre Azotu (N)	% 2,5
Suda Çözünür Fosfor PentaOksit (P ₂ O ₅)	% 10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 30
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	% 5

Özellikler: IDROFLORAL 15 - 10 - 30 + (5 SO₃), açık alanlarda ve seralarda damla sulama uygulamaları için geliştirilen yüksek saflıkta ve çözünebilir bir toz gübredir. Aynı zamanda yaprak uygulamaları için de kullanılabilir. Makro elementler arasındaki oran (1,5:1:3), genel olarak bitkilerin vejetatif döngüsünün orta ve son dönemleri için uygundur ve potasyum absorbe eden bitkilerin besin ihtiyaçlarını karşılar. Azot, elementin sürekli etkinliğini sağlamak amacıyla hem hazır kullanılabilir formda (nitrat parçalanması) hem de kademeli formda (amonyak ve üre parçalanmaları) bulunur. Sülfürün varlığı, besin elementlerinin, bitkiler tarafından maksimum özümlemesini sağlar.

Doz ve Kullanım Talimatları

Gübreleme: Doğru bir uygulama için, döngüye yalnızca su ile başlamanız önerilir, daha sonra esas gübrelemeyi uygulayınız ve son döngüde, ekipmanı temizlemek için yalnız su kullanarak gerçekleştiriniz.

ÜRÜN	UYGULAMA SÜRESİ	DOZ kg/ha
Armu, Elma, Şeftali, Kayısı, Erik, Vişne, Zeytin, şaraplık üzüm	Çiçeklenme Dönemi öncesinden olgunlaşma dönemine kadar	100-200*
Narenciye ve ağaçlar	Meyve oluşumundan olgunlaşma dönemine kadar	120-140*
Kivi	Meyve oluşumundan olgunlaşma dönemine kadar	100-150*
Meyvesi yenen sebzeler	Meyve oluşumundan olgunlaşma dönemine kadar	10-12 kg/1000 m ²
Fidanlıklar	Vejetatif dönemden çiçeklenmeye kadar	10-12 kg/1000 m ²
Kesme Çiçekler	Vejetatif dönemden çiçeklenmeye kadar	10-12 kg/1000 m ²

*Uygulanacak toplam doz, birkaç uygulamalara bölünmüştür. Püskürtme çubuğu ya da lister ile yapılan toprak gübrelemesi uygulamalarında, minimum su gübre oranı = 1:10 olacaktır.

Yaprak uygulamaları:

- **Bahçelerde ve Bahçelerde:** Meyve olgunlaşmasından hasada kadar uygulanır. 3-4 kg/ha
- **Sebzeler:** Meyve tutumundan hasata kadar uygulanır. 3-4 kg/ha.
- **Endüstri bitkileri:** Meyve tutumundan hasada kadar uygulanır. 3-4 kg/ha
- **Kesme Çiçekler:** tomurcuk oluşumunda uygulanır. 300 g/100 L

UYARI

Kapalı alanlardaki (seralar, tüneller, vs.) yaprak uygulamaları için dozajlar, 200 g/100 L su (%0,2) oranını geçmemelidir. Yaprak uygulamaları, günün en serin saatlerinde gerçekleştirilmelidir. İthalatçı firma, ürünün kalitesini garanti eder, ancak ürünün kendisinin yanlış şekilde veya üretici tarafından önerilen uygulamalarından farklı şekillerde kullanılmasından kaynaklanan zarar ve ziyanlarda ve ürünün istenilen randımanın alınmamasından dolayı sorumluluk kabul etmez. **Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.**

ÜRÜNÜ YALNIZCA GERÇEK İHTİYAÇLAR DURUMUNDA KULLANINIZ. ÖNERİLEN DOZLARI AŞMAYINIZ. ÜRÜN, NORMAL SAKLAMA SICAĞLIKLARINDA SAKLANDIĞINDA DEĞİŞİME MARUZ KALMAMAKTADIR. DİKKATLİCE MUHAFAZA EDİLEREK TEHLİKELİ DEPOLAMADAN KAÇINILMALIDIR TEHLİKELİ DEPOLARDAN UZAK OLARAK DİKKATLE SAKLAYINIZ. ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ. AĞIZ YOLUYLA VÜCUDA ALMAYINIZ. KULLANDIKTAN SONRA ELLERİNİZİ BOL SU İLE YIKAYINIZ. TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DİŞİNDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR. GÖZLERE TEMAS HALİNDE DERHAL BOL SU İLE YIKAYINIZ VE TIBBİ YARDIM ALINIZ. KULLANIM SONRASI BOŞ KUTUYU ETRAFTA BIRAKMAYINIZ.

DEPOLAMA SICAĞLIĞI: -10° +30°C (DERECE) ÖLMALIDIR

Üretim Tarihi : **Ambalajın üzerindedir.**

Parti No : **Ambalajın üzerindedir.**

Son Kullanma Tarihi: **Üretim tarihinden itibaren beş yıldır.**

Tescil No: **13019**

Lisans No: **1066**

İtalya'dan ithal Edilmiştir.

Net ağırlık:

ÜRETİCİ FİRMA:

Cifo S.r.l.
San Giorgio di Piano
Bologna İTALYA
www.cifo.it info@cifo.it

İTHALATÇI FİRMA:


CİFAGRO TARIM İLAÇ VE
GÜBRE ÜRÜNLERİ SATIŞ VE
PAZARLAMA LTD ŞTİ.
Çınarlı Mah. 61027 Sokak Sunar
Nuri Çomuş İş ve Alışveriş Merkezi
A Blok No:18 İç Kapı No:81
Seyhan / Adana / TÜRKİYE
Tel: +90 322 456 25 56
Fax: +90 322 456 25 66
Web: www.cifagro.com.tr

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksiinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.



EC FERTILIZER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

IDROFLORAL 15 - 10 - 30 + (5 SO₃)



POLVERE SOLUBILE

Idrofloral 15-10-30

CONCIME CE

Concime NPK (S) 15-10-30 (5) a basso tenore di cloro ottenuto per miscelazione

Azoto (N) totale	15%
Azoto (N) nitrico	8,5%
Azoto (N) ammoniacale	4%
Azoto (N) ureico	2,5%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅)	
solubile in citrato ammonico neutro e in acqua	10%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua	10%
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	30%
Anidride solforica (SO ₃) solubile in acqua	5%

Caratteristiche

Idrofloral 15-10-30 è un concime in polvere ad elevata purezza e solubilità, appositamente studiato per applicazioni in fertirrigazione, a pieno campo e in serra, ma utilizzabile anche per applicazioni fogliari.

Il rapporto tra i macroelementi (1,5:1:3) è indicato per le fasi medie e finali del ciclo vegetativo delle colture in genere, inoltre soddisfa le esigenze nutritive delle piante potassofile. L'apporto azotato risulta essere sia in forma prontamente disponibile (frazione nitrica) che graduale (frazione ammoniacale e ureica) per garantire un'azione continua dell'elemento.

La presenza di zolfo e la reazione fisiologicamente acida del formulato consentono la massima assimilazione dei nutrienti da parte delle piante.

L'utilizzo di Idrofloral 15-10-30 favorisce l'ottenimento di produzioni qualitativamente superiori, con una maggiore colorazione, un contenuto più elevato in zuccheri, aromi e profumi.

Dosi e modalità d'impiego

Fertirrigazione

Per una corretta applicazione si consiglia di fare l'inizio ciclo solamente con acqua, poi la fertirrigazione vera e propria e la fine del ciclo con solo acqua per pulire l'impianto.

COLTURA	PERIODO D'APPLICAZIONE	DOSE kg/ha
Pero, melo, pesco, albicocco, susino, ciliegio, olivo, vite	Dalla pre-fioritura alla maturazione	100 - 120*
Agumi ed arboree in genere	Dall'allegagione alla pre-raccolta	120 - 140*
Actinidia	Dall'allegagione alla pre-raccolta	100 - 150*
Ortaggi	Dal frutticino alla maturazione	10 - 12 Kg/1000 m ²
Vivai	Dalla stasi vegetativa alla fioritura	10 - 12 Kg/1000 m ²
Piante ornamentali e da fiore	Dalla stasi vegetativa alla fioritura	10 - 12 Kg/1000 m ²

(*) Dose totale da somministrare frazionata in più interventi. In caso di fertirrigazione al terreno con barra irroratrice o assolcatore, considerare un rapporto minimo concime : acqua di 1:10.

Concimazione fogliare

- **Frutteto e Vigneto:** eseguire le applicazioni da ingrossamento frutto alla raccolta. 3-4 Kg/ha.
- **Ortaggi:** eseguire le applicazioni a partire da metà ciclo colturale. 3-4 Kg/ha.
- **Culture industriali:** eseguire le applicazioni da metà ciclo colturale. 8-10 Kg/ha.
- **Culture floricole:** eseguire le applicazioni alla fase di formazione bocciolo. 300 g/hL.

Avvertenze

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.) la dose fogliare non deve superare i 200 g per 100 litri di acqua (0,2%). Le applicazioni fogliari vanno effettuate di norma nelle ore più fresche della giornata. La CIFO, mentre garantisce la qualità del prodotto, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali derivanti da applicazioni non corrette del prodotto stesso o comunque difformi dalle indicazioni suggerite.

Immagazzinare con cura e attenzione, evitando stoccaggi precari. Il prodotto non subisce alterazioni immagazzinato alle normali temperature di stoccaggio. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

PESO NETTO

FABBRICANTE: CIFO S.r.l. - Via Oradour 6/8 - 40016 S. Giorgio di Piano (BO) - Stab. di San Giorgio di Piano (BO) - tel. 051 6655511

