

EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
IDROFLORAL 8 - 5 - 44 + (5 SO₃)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(W / W)
Toplam Azot (N)	% 8
Nitrat Azotu (N)	% 8
Suda Çözünür Fosfor PentaOksit (P ₂ O ₅)	% 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 44
Suda Çözünür Kükürt trioksit (SO ₃)	% 5

ÖZELLİKLER

IDROFLORAL 8 - 5 - 44 + (5 SO₃), açık arazilerde ve seralardaki gübreleme işlemlerinde kullanılan ve ayrıca yaprak uygulamalarında da kullanılabilen son derece saf ve çözünabilir bir toz gübredir. Makro elementler (1,5:1:9) içindeki oranda, potasyumundaki yüksek içerik, genel olarak ürünlerin bitkisel evrelerinin son dönemleri sırasında ürün uygunluğunu oluşturur ve potasyuma doymamış bitkilerin beslenme gerekliliklerini karşılar.

DOZ VE KULLANIM TALİMATLARI

Gübreleme (Damlama sulama)

Doğru bir uygulama için, aşamaya sadece suyla başlanması daha sonra gerçek gübrelemenin yerine getirilmesi ve ekibmanın temizlenmesi için sadece suyla son aşamanın gerçekleştirilmesi uygun olur.

ÜRÜN	UYGULAMA SÜRESİ	DOZ kg/ha
Armut, elma, şeftali, kayısı, erik, kiraz, fındık, zeytin, asma	Yeniden bitkisel büyümeden meyve yumrularının başlangıcına kadar	100-200*
Genel olarak narenciye ve ağaç bitkileri	Meyve oluşumundan ön hasat dönemine kadar	120-140*
Çin'e özgü bir üzüm türü (Actinidia)	Meyve oluşumundan ön hasat dönemine kadar	100-150*
Sebzeler	Ürün döneminin son evresi sırasında	10-12 kg/1.000 m²
Fidanlıklar	Ürün döneminin son evresi sırasında	10-12 kg/1.000 m²
Kesme Çiçekler	Ürün döneminin son evresi sırasında	10-12 kg/1.000 m²

(*) Toplam doz birkaç uygulamaya bölünür. Ani - spreyli veya listeleyici (lister) zemin gübrelemesi durumunda, minimum gübre - su oranı 1:10 olmalıdır.

Yaprak Uygulamaları

- **Bağlar ve asmalar:** Meyve yumrularından hasada kadar. 3 - 4 kg/ha
- **Sebzeler:** Ürün döneminin son evrelerinde. 3 - 4 kg/ha
- **Endüstriyel ürünler:** Ürün döneminin orta evrelerinden itibaren. 8 - 10 kg/ha
- **Kesme Çiçekler:** Filizlerin oluşmasında. 300 g/100 L

UYARILAR

Kapalı alanlardaki (seralar, tüneller vs) yaprak uygulamasının dozajları, suyun 200 g/100 L'sini (% 0,2) aşmamalıdır. Yaprak uygulamaları günü en soğuk saatleri sırasında yapılmış olmalıdır. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

FİRMA BEYANI

İthalatçı firma, ürünün kalitesini garanti eder, ancak ürünün kendisinin yanlış şekilde veya üretici tarafından önerilen uygulamalardan farklı şekillerde kullanılmasından kaynaklanan zarar ve ziyanlarda ve üründen istenilen randımanın alınmamasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

DİKKAT

ÜRÜNÜ NORMAL DEPOLAMA SICAKLIĞINDA MUHAFAZA EDİLİRSE ÜRÜNDE BOZULMA YAŞANMAZ. DİKKATLİCE MUHAFAZA EDİLEREK TEHLİKELİ DEPOLAMADAN KAÇINILMALIDIR. AĞIZ YOLU İLE VÜCUDA ALMAYINIZ. KULLANDIKTAN SONRA ELLERİNİZİ YIKAYINIZ. GÖZLERE TEMAS ETMESİ HALİNDE DERHAL BOL SU İLE YIKAYINIZ VE TIBBİ YARDIM ALINIZ. ÜRÜNÜ KULLANDIKTAN SONRA BOŞ KUTUYU ÇEVREYE ATMAYINIZ. DEPOLAMA SICAKLIĞI 0 - +30 DERECEDİR

Üretim Tarihi : Ambalajın üzerindedir.

Parti No : Ambalajın üzerindedir.

SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren beş yıldır.

TESCİL NO : 13315

LİSANS NO : 1066

İtalya'dan İthal Edilmiştir.

NET AĞIRLIK :

ÜRETİCİ FİRMA:

CIFO S.r.l - San Giorgio di Piano - Bologna İTALYA
www.cifo.it info@cifo.it

İTHALATÇI FİRMA

CİFAGRO TARIM İLAÇ VE GÜBRE ÜRÜNLERİ
SATIŞ VE PAZARLAMA LTDÇ ŞTİ.

Çınarlı Mah. 61027 Sokak Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi

A Blok No:18 İç Kapı No:81 Seyhan / Adana / TÜRKİYE

Tel: +90 322 456 25 56

Fax: +90 322 456 25 66


Web: www.cifagro.com.tr

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.



EC FERTILISER NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ

IDROFLORAL 8 - 5 - 44 + (5 SO₃)



POLVERE SOLUBILE

Idrofloral 8-5-44

CONCIME CE

Concime NPK (S) 8-5-44 (5) ottenuto per miscelazione

Azoto (N) totale	8%
Azoto (N) nitrico	8%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua	5%
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua	5%
Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua	44%
Anidride solforica (SO ₃) solubile in acqua	5%

Caratteristiche

IDROFLORAL 8-5-44 è un concime in polvere ad elevata purezza e solubilità, appositamente studiato per applicazioni in fertirrigazione, a pieno campo e in serra, ma utilizzabile anche per applicazioni fogliari. L'elevato contenuto in potassio nel rapporto tra i macroelementi (1,5:1:9) rende il formulato indicato per le fasi finali del ciclo vegetativo delle colture in genere, inoltre soddisfa le esigenze nutritive delle piante potassofile.

La presenza di zolfo e la reazione fisiologicamente acida del formulato consentono la massima assimilabilità dei nutrienti da parte delle piante.

L'utilizzo di IDROFLORAL 8-5-44 favorisce l'ottenimento di produzioni qualitativamente superiori, frutti consistenti, con una maggiore colorazione, un contenuto più elevato in zuccheri, aromi e profumi.

Dosi e modalità d'impiego

Fertirrigazione

Per una corretta applicazione si consiglia di fare l'inizio ciclo solamente con acqua, poi la fertirrigazione vera e propria e la fine del ciclo con solo acqua per pulire l'impianto.

COLTURA	PERIODO DI APPLICAZIONE	DOSE kg/ha
Pero, melo, pesco, albicocco, susino, ciliegio, nocciolo, olivo, vite	Dall'ingrossamento frutto alla maturazione	100 - 120*
Agrumi ed arboree in genere	Dall'allegagione alla pre-raccolta	120 - 140*
Actinidia	Dall'allegagione alla pre-raccolta	100 - 150*
Ortaggi	Nell'ultima fase del ciclo colturale	10 - 12 kg/ 1000m²
Vivai	Nell'ultima fase del ciclo colturale	10 - 12 kg/ 1000m²
Piante ornamentali e da fiore	Nell'ultima fase del ciclo colturale	10 - 12 kg/ 1000m²

(*) Dose totale da somministrare, frazionata in più interventi. In caso di fertirrigazione al terreno con barra irroratrice o assolcatore, considerare un rapporto minimo di concime: acqua di 1:10.

Concimazione fogliare

Frutteto e vigneto: eseguire le applicazioni da ingrossamento frutto alla maturazione. 3-4 kg/ha

Ortaggi: eseguire le applicazioni nell'ultima fase del ciclo colturale. 3-4 kg/ha

Culture industriali: eseguire le applicazioni da metà ciclo colturale. 8-10 kg/ha

Culture floricole: eseguire le applicazioni alla fase di formazione bocciolo. 300 g/hl

Avvertenze

In ambiente protetto (serre, tunnel, ecc.) la dose fogliare non deve superare i 200 g per 100 l di acqua (0,2%). Le applicazioni fogliari vanno effettuate di norma nelle ore più fresche della giornata. La CIFO, mentre garantisce la qualità del prodotto, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali derivanti da applicazioni non corrette del prodotto stesso o comunque difformi dalle indicazioni suggerite.

IL PRODOTTO NON SUBISCE ALTERAZIONI IMMAGAZZINATO ALLE NORMALI TEMPERATURE DI STOCCAGGIO.

IMMAGAZZINARE CON CURA E ATTENZIONE, EVITANDO STOCCAGGI PRECARI.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Peso netto

Fabbricante: CIFO S.r.l. - Via Oradour 6/8

San Giorgio di Piano (BO) - Stab. di San Giorgio di Piano (BO)



8 022963 221881