


MAGNESIUM FAST



MAGNESIUM FAST

Ciddi göz hasarına neden olur. Deri ve gözde ciddi yanmalara neden olur. Çocuklardan uzak tutunuz. Çıkan koku, buhar ve uçucu maddeleri sakın içinize çekmeyiniz. Kullandıktan sonra göz ve cildinizi yıkayınız. Kullanırken yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz. Uygun koruyucu elbise, eldiven ve göz/yüz koruyucu takınız. Yutulduğu zaman: Ağzınızı su ile çalkalayınız. Kendinizi kusturmayınız. Cilt ve deri temasında: Buluşan tüm giysilerinizi hemen çıkartınız ve duş alınız. Koklandığı zaman: Rahat nefes alınacak bir pozisyona geçin ve temiz havayı içinize çekiniz. Gözlere temasta: Dikkatlice birkaç kez bol su ile yıkayınız. Lens kullanıyorsanız çıkarıp gözlerinizi su ile yıkamaya devam ediniz. Acil durumlarda mutlaka doktora gidiniz. Ürünü depoda saklayınız. Kuralara uygun şekilde işe imha ediniz.



TEHLİKELİ

NET AĞIRLIK

HACİM

Üretici: Cifo S.r.l. - Via Oradour 6/8 San Giorgio di Piano (BO) - Italy
Tel. +39/51-66.555.11

EC FERTILIZER MAGNEZYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİ MAGNESIUM FAST

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda çözünür Magnezyum oksit (MgO)	% 6
Suda çözünür Kükürt trioksit (SO ₃)	% 12

Dozlar ve kullanım talimatları (her dekar için doz)

Magnesium Fast, eksikliğin ilk semptomları ortaya çıktığında tavsiye edilen dozlarda yaprak uygulamaları ile tadbik edilmelidir.

Ürün vegetasyon başlangıcından itibaren 10-15 gün aralıklarla 2-3 uygulama. Fidan dikiminde kullanılırsa, 100 ml/da'lık su kullanılarak uygulama, otsu bitkiler için ise en az 50 ml/da su kullanılarak uygulanmalıdır.

Elma (olgunlaşmamış yaprak dökümü): 90-100 ml/da (golden) 100-110 ml/da (diğer cinsler, haziran ortasından itibaren 12-15 gün aralıklarla 3 uygulama yapılmalıdır.)

Üzüm: 100-110 ml/da, tomurcuklanma oluşumunda, 15-20gün sonra aynı uygulama tekrarlanır. Karamadan 10-15gün önce tekrar uygulayın.


Meyve ağaçları (zeytin, narenciye): 70-80 ml

Otsu ve endüstriyel bitkiler: 70-80 ml


Fidanlık ve süs bitkileri: 70-80 ml

Kesme Çiçekçilik : 4-5 ml

Kapalı alanlarda (seralarda, tünellerde, vb..)



MAGNESIUM FAST



yaprak analizine dozajı 40 ml/100 L geçmemelidir. Uygulamalar günün en serin saatlerinde yapılmalıdır. Hızlı ve en iyi çözüm için ürünü sulandırınız.

ithalatçı firma firması ürünün kalitesini garanti etmektedir fakat dolaylı zararlardan veya ürünün yanlış uygulanmasından ya da üretici tarafından önerilen farklı bir şekilde kullanılmasından kaynaklanan kısmen başarılı sonuçlardan sorumlu değildir.

Uyuma

2.4 D - 2.4 DB - 2.4 DP- MCPA, MCPB, MECOPROP, DICAMBA bazı formülasyonları istisna olmak üzere kullanıcının dozajında genellikle CIFO formülasyonları ve insektisitler ile karıştırılabilir. Ürünün uyumasına yönelik olarak insektisit etiketini kontrol etmek faydalıdır.

Kullanmadan önce çalkalayınız.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

ÜRÜN, NORMAL SAKLAMA SICAĞI KLARINDA BİR DEĞİŞİKLİĞE UĞRAMAZ. ÖZENLE SAKLAYINIZ.

DEPOLAMA SICAĞI: +4° - +30° C (DERECE) OLMALIDIR.

Üretim Tarihi : Ambalajın üzerindedir.

Parti No : Ambalajın üzerindedir

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren beş yıldır

Tescil No: 13539

Lisans No: 1066

İtalya'dan İthal Edilmiştir.

Hacim :

Net Ağırlık:

ÜRETİCİ FIRMA: CIFO S.r.l.

Via Oradour 6/8,
San Giorgio di Piano (BO) ITALY
Production plant of
San Giorgio di Piano (BO)

İTHALATÇI FIRMA: CİFAGRO TARIM İLAÇ VE GÜBRE ÜRÜNLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA LTD ŞTİ.

Çınarlı Mah. 61027 Sokak Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi

A Blok No:18 İç Kapı No:81

Seyhan / Adana

TÜRKİYE

Tel: +90 322 456 25 56

Fax: +90 322 456 25 66

Web : www.cifagro.com.tr