

ÜRÜN	DOZ	UYGULAMA DÖNEMİ
Kökleri Daldırma	% 0,8-2	Dikim öncesi, hazırlanan soluyona birkaç (2-10 dk) dakika daldırma

****Doz ve uygulama sayısı tamamen belirleyicidir ve ürünün ihtiyacına, fenolojik evreye ve hava koşullarına göre ayarlanmalıdır.

UYARILAR

Yüz ve göz çevresinden uzak tutunuz. Ürün normal sıcaklık ve basınç koşullarında stabildir.

4 - 40°c sıcaklıkları arasında depolanmalıdır. Ürün yanıcı değildir. Tehlikeli depolamalardan koruyun ve dikkatli bir şekilde saklayın.

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Son Kullanma Tarihi : Üretim tarihinden itibaren beş yıldır.

Tescil No : 2021TO338

Lisans No : 753

Parti/Seri No : Ambalajın üzerindedir.

İtalya'dan ithal edilmiştir.

ÜRETİCİ FIRMA:

CİFO SRL

Via Oradour 6/8, San Giorgio di Piano (BO) ITALY

İTHALATÇI FIRMA:

CİFAGRO TARIM İLAÇ VE GÜBRE ÜRÜNLERİ

SATIŞ VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

Çınarlı Mah. 61027 Sokak Sunar Nuri Çomu İş ve

Alışveriş Merkezi

A Blok No:18 İç Kapı No:81

Seyhan/ADANA/TÜRKİYE

Tel: +90 322 456 25 56

Fax: +90 322 456 25 66

Web : www.cifagro.com.tr

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.



Net Hacim : 1 L



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER İZ ELEMENT KATKILI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

RADICIFO



ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER İZ ELEMENT KATKILI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE RADICIFO

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	w/w
Organik Madde	%24
Toplam Humik Asit + Fulvik Asit	%2
Suda Çözünür Çinko (Zn)	%1
EDTA Şelatlı Çinko (Zn)	%1
Maksimum Klor (Cl)	%2
pH	6-8

ÖZELLİKLER

RADICIFO, ürün döngüsünün ilk evrelerini destekler. Bitkilerin gelişmesine katkıda bulunur.

FİRMA BEYANI

İthalatçı firma ürün kalitesini garantiler ancak sonraki zararların veya ürünün kendisinin yanlış uygulamasından veya üretici tarafından önerilenden farklı uygulamalardan oluşan kısmi başarılı sonuçların sorumluluğunu almaz.

UYUMLULUK

RADICIFO, mineral yağlar, yağ bazlı böcek ilaçları hariç birçok formülasyonla belirlenen dozajlarda tüm Cifo ürünleri ile karıştırılabilir. Yine de ön uyumluluk testleri yapılması tavsiye edilir.

DOZ VE KULLANIM TALİMATLARI:

DAMLAMA SULAMA

ÜRÜN	DOZ	UYGULAMA DÖNEMİ
Meyve ağaçları (yumuşak ve sert çekirdekli ürünler, narenciye meyveleri, asma, zeytin, kivi vb.)	1 - 1,5 L/da	Dikimden sonra/vegetatif başlangıçta 7-12 gün ara ile 2 uygulama
Çiçek ve küçük meyveler	1 - 1,5 L/1000 m ²	Dikimden sonra 7-12 gün ara ile uygulama
Sera sebzeleri	1 - 1,5 L/1000 m ²	Dikimden sonra 7-12 gün ara ile uygulama
Açık arazi sebzeleri	1 - 1,5 L/da	Ekimden/dikimden sonra 7-12 gün ara ile 2 uygulama
Endüstriyel ürünler ve tahıllar	500 mL/da	Oluşumdan sonra, FOXTER ile birlikte
Fidanlık bitkileri, çiçekli bitkiler ve kesme çiçekçilik	1 - 1,5 L/1000 m ²	Dikimden/saksıya ektikten sonra veya vegetatif başlangıçta 7-12 gün ara ile 2 uygulama